



Kabinet za nadzor bolničkih infekcija i kontrolu sterilizacije

Broj: ZC-02-2224/1

Datum: 22.11.2011.godine

UPUSTVA ZA KONTROLU HIGIJENSKE ISPRAVNOSTI UZORAKA U BOLNIČKOJ SREDINI

I) UPUSTVO ZA UZIMANJE BRISEVA RADNIH POVRŠINE

(procedura)

Kontrola briseva radnih površina i aparata

- Sterilnim brisom od vate natopljenim sterilnim fiziološkim rastvorom pređe se površina dimenzija 5 x 5 cm, tako što se bris rotira preko te površine i mora se zahvatiti cela površina:**

* pripremiti kartončice dimenzija 5 X 5 cm za označavanje površina

II) UPUSTVO ZA UZIMANJE UZORAKA VAZDUHA

(procedura)

Uputstvo za uzorkovanje vazduha radi određivanja ukupnog broja bakterija u vazduhu (sedimentacionom metodom)

- Petri šolja sa odgovarajućom podlogom (krvnim agarom) se izlaže u određenom vremenu na određenom mestu.**
- Na uputu je potrebno naznačiti KOLIKO DUGO je u minutima vršeno izlaganje Petri šolje (5, 10, 15, 20 , itd minutu), kao i MESTO gde je ono vršeno.**
- Najčešće se izlaganje vrši 15 minuta!**

- Normativi za kvantifikaciju mikroorganizama u vazduhu, u našoj zemlji ne postoje.
- Koriste se orijentacioni normativi za vazduh u bolničkoj sredini, metodom sedimentacije.
- Prema APHA, nalaz 15 kolonija (tj. 787 bakterija u m³) ukazuje na propuste u održavanju prostorija i zaustavlja rad u njima, do otklanjanja uzroka kontaminacije vazduha.

<i>lokacija</i>	<i>dozvoljen broj</i>
Operacione sale	0 - 120
Porodilišta, intenzivna nega	300 - 400
Bolesničke sobe	400 - 500

Preporuke za tumačenje mikrobiološkog uzorkovanja

- 1.Ne preporučuje se rutinsko mikrobiološko uzorkovanje vazduha i horizontalnih površina
- 2.Voda koja se koristi za pripremanje tečnosti za dijalizu preporučuje se uzorkovanje jedanput mesečno, i ne bi trebalo da sadrži više od 200CFU/ml. Tečnost za dijalizu uzorkuje se jedanput mesečno na kraju dijalize i treba da sadrži manje od 2000CFU/ml.
- 3.Mikrobiološko uzorkovanje trebalo bi raditi samo u epidemiološkim indikacijama.
- 4.a)Ne preporučuje se rutinsko mikrobiološko uzorkovanje predmeta za negu pacijenata za koje se predpostavlja da su sterilni
 - b)Ukoliko se posumnja da je došlo do kontaminacije komercijalnih proizvoda koji su kupljeni kao sterilni, trebalo bi obavestiti odgovrne osobe u službi gde se ta pojava desila, kao i lica zadužena za nadzor i kontrolu bolničkih infekcija u ustanovi, a sumnjivu količinu proizvoda odmah odvojiti i obavestiti nadležne službe.